



Kinder- und Jugendgesundheitsdienst  
**Das Gesundheitsamt Bremerhaven informiert**

**Steckbrief: Scharlach**

**Verursacht durch:** Bakterien ( Streptokokken )

**Symptome:** Übelkeit, Erbrechen, hohes Fieber, Halsschmerzen, Himbeerzunge, blasses Munddreieck, feinfleckiger Ausschlag am Stamm, an Armen und Beinen

**Komplikationen:** zu erwarten, wenn keine Behandlung erfolgt, unabhängig von der Schwere des Verlaufs

**Übertragung:** Tröpfcheninfektion

**Inkubationszeit:** der Zeitraum zwischen Ansteckung und Ausbruch der Erkrankung beträgt 2-4 Tage  
Behandlung: erfolgt zwingend mittels Antibiotikagabe in der Regel über 10 Tage

**Ansteckungsgefahr:** unbehandelt ist Scharlach ca. 3 Wochen ansteckend. Bei antibiotischer Behandlung besteht nach 24 Std. keine Ansteckungsgefahr mehr.

**Gefahr in der Schwangerschaft:** keine bekannt.

**Vorbeugende Behandlung:** nicht sinnvoll.

**Besuch der Gemeinschaftseinrichtung:** mit ansteckendem Scharlach nicht erlaubt, frühestens 2 Tage nach Beginn der Behandlung mit Antibiotika und Abklingen der Krankheitszeichen wieder möglich.